

SMR.11. Przestrzeganie norm ochrony cieląt

Lp.	Wymogi zgodności	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	Opis stanu stwierdzonego
11.1.	Cielęta powyżej 8 tygodnia życia nie są utrzymywane w pojedynczych boksach, z wyjątkiem: a) gospodarstw utrzymujących mniej niż 6 cieląt jednocześnie, b) cieląt chorych, c) cieląt utrzymywanych z matkami, w okresie ssania.				
11.2.	Kojce, w których cielęta utrzymywane są pojedynczo mają właściwe wymiary oraz budowę tj.:				
	długość - min. 1,1 długości ciała cielęcia,				
	szerokość - minimum wysokość w kłębie cielęcia,				
	ściany kojca zapewniają kontakt wzrokowy i fizyczny między cielętami.				
11.3.	Kojce, w których cielęta utrzymywane są grupowo zapewniają, co najmniej:				
	1,5 m ² – dla cieląt o masie ciała do 150 kg;				
	1,7 m ² – dla cieląt o masie ciała 151-220 kg;				
	1,8 m ² – dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg.				
11.4.	Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt				

	oraz nadających się do czyszczenia i odkażania.				
11.5.	Instalacja elektryczna w pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta wykonana jest w sposób określony w przepisach Prawa budowlanego.				
11.6.	W pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta obieg powietrza, stopień zapylenia, temperatura, względna wilgotność powietrza i stężenie szkodliwych gazów utrzymywane są na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt. W pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta:				
	1) stężenie: a) dwutlenku węgla (CO ₂) nie przekracza 3 000 ppm,				
	b) siarkowodoru (H ₂ S) nie przekracza 5 ppm;				
	2) koncentracja amoniaku (NH ₃) nie przekracza 20 ppm.				
11.7.	Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są sprawdzane, co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwane.				
11.8.	Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażone są w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji i system ten łączy się z:				
	1) systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu wentylacyjnego, a system ten jest <u>regularnie testowany</u> ;				
	2) systemem wentylacji awaryjnej.				

11.9.	Cielęta mają zapewniony dostęp do światła naturalnego lub pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, oświetlone są przystosowanym dla nich światłem sztucznym, (co najmniej pomiędzy godziną 9.00 a 17.00).				
11.10.	W celu kontroli pomieszczeń, w których utrzymywane są cielęta oraz doglądania umieszczonych w nich cieląt o każdej porze, pomieszczenia te wyposażone są: w stałe lub przenośne oświetlenie sztuczne.				
11.11.	Rolnik dogląda cielęta:				
	1) utrzymywane w systemie otwartym, co najmniej raz dziennie;				
	2) utrzymywane w pomieszczeniach, co najmniej dwa razy dziennie.				
11.12.	Rolnik otacza opieką chore lub ranne cielęta i: - kiedy opieka rolnika nie przynosi rezultatów, jak najszybciej uzyskuje poradę weterynaryjną dla każdego z cieląt, - w razie potrzeby odizolowuje chore lub ranne cielęta. - w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia zwierzęcia, zwierzę to utrzymuje się na ściółce.				
11.13.	Cielęta utrzymywane są w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania, leżenia.				
11.14.	Cielęta nie są utrzymywane na uwięzi, z wyjątkiem cieląt utrzymywanych grupowo w porze karmienia nie dłużej				

	niż jedną godzinę.				
11.15.	W przypadku grupowego utrzymywania cieląt na uwięzi podczas karmienia, rolnik nie stosuje do ich wiązania upręży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń, które zmuszają cielęta do przebywania w nienaturalnej pozycji i powodują zbędny ból, uszkodzenie ciała albo śmierć.				
11.16.	Pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, wyposażenie tych pomieszczeń oraz sprzęt używany przy utrzymywaniu tych zwierząt są czyszczone i odkażane.				
11.17.	Rolnik zapewnia, że:				
	1) odchody cieląt oraz niezjedzone resztki paszy są usuwane z pomieszczeń, w których utrzymuje się te zwierzęta, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni;				
	2) pomieszczenia, w których utrzymywane są cielęta, są zabezpieczone przed muchami i gryzoniami.				
11.18.	Podłoga w pomieszczeniach, w których utrzymywane są cielęta jest twarda, równa i stabilna, a jej powierzchnia gładka i nieśliska.				
11.19.	Miejsce do leżenia dla cieląt jest wygodne, czyste i odwodnione.				
11.20.	Cielęta w pomieszczeniach utrzymywane są na ściółce do ukończenia 2 tygodnia życia.				
11.21.	Cielęta są karmione paszą dostosowaną do ich gatunku, wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego.				

11.22.	W żywieniu cieląt stosowane są pasze zawierające taką ilość żelaza, która zapewnia w ich krwi poziom hemoglobiny wynoszący, co najmniej 4,5 milimol/litr.				
11.23.	W żywieniu cieląt powyżej drugiego tygodnia życia stosowana jest pasza włóknista, przy czym dawkę tej paszy dla cieląt od 8 do 20 tygodnia życia zwiększa się od 50 do 250 g dziennie.				
11.24.	Cielętom nie zakłada się kagańców.				
11.25.	Cielęta karmione są, co najmniej dwa razy dziennie.				
11.26.	W gospodarstwie każde cielę utrzymywane grupowo ma zapewniony dostęp do paszy jednocześnie. Wymóg nie dotyczy gospodarstw, w których zwierzęta są żywione do woli lub z elektronicznych stacji odpasowych.				
11.27.	Cielęta powyżej 2 tygodnia życia mają zapewniony dostęp do świeżej wody lub innych płynów zaspokajających pragnienie. W przypadku upałów oraz cieląt chorych zapewniony jest stały dostęp do świeżej wody.				
11.28.	Wyposażenie i sprzęt przeznaczone do karmienia i pojenia cieląt umieszczony jest w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody.				
11.29.	Cielęta otrzymują pokarm matki niezwłocznie po urodzeniu, lecz nie później niż przed upływem 6 godzin.				